



BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT
AZ ARANYÉRBETEGSÉG ÉS ANNAK KEZELÉSÉHEZ

TÁJ/1315

A betegség:

Az aranyér (nodus haemorrhoidalis) a végbélnyílás nyálkahártyája alatt elhelyezkedő érpárnából áll. Kóros esetben ez megduzzad, vérezni kezd, begyullad, vagy előesik, mely orvosi kezelést igényel. Elhelyezkedésük szerint beszélünk külső és belső aranyerekről.

A vérzés foka és az aranyeres csomó előesése alapján négy súlyossági fokot különböztetünk meg:

- I. stádium: megnagyobbodott, vérzékeny csomó, előesés nélkül
- II. stádium: előeső, de spontán visszahúzódó csomó, vérzéssel
- III. stádium: előeső, spontán vissza nem húzódó csomó, visszahelyezhető, vérzékeny, nedvező csomó
- IV. stádium: állandóan előesett, vissza nem helyezhető aranyér, ezt végbél előesésnek is nevezik.

Különleges helyzet az aranyér kizáródása, ami vérkeringési zavar miatt elhalást okozhat, súlyos fertőzés veszélyével, ez a helyzet sürgősségi megoldást igényel. Ezek a stádiumok befolyásolják a kezelési lehetőséget.

Kezelés:

Cél: a tünetmentesség elérése, ha lehet az aranyerek eltávolítása nélkül.

- I. stádiumban fertőtlenítő ülőfürdők alkalmazása, a széklet gyakoriságának, állagának rendezése javasolt.
- II. stádiumtól a fenti eljárások csak időleges eredményeket hoznak. Az előesett csomóra egy speciális eszközzel gumigyűrűt lehet felhelyezni, mely a vérellátását megszünteti. Az eljárást kiegészíthetjük, vagy önállóan is kezelhetjük a csomókat fagyasztással, vagy infravörös koagulációval.
- III. stádium bizonyos eseteiben még a gyűrűzés hatásos lehet.

Végleges megoldást az aranyeres csomók sebészi eltávolítása (haemorrhoidectomia) jelenti, mely a IV. stádiumban már egyedülként alkalmazható eljárás.

A **műtétet** a végbél - hashajtással, vagy beöntésekkel történt - kitisztítása után végezzük. A műtétet végbéltükrözés előzi meg. A műtéti érzéstelenítésről részletes felvilágosítást az altatóorvos ad.

A műtétnek két alaptípusa van. Az egyiknél az aranyeres párna érellátása lekötésre kerül, a megnagyobbodott csomókat eltávolítjuk. Ennek során a végbél finom záró funkciója károsodhat. A másik eljárás során az aranyeres párna körüli lágyszövetet rövidítjük meg, ezáltal az aranyér visszahúzódik a végbélbe, szövetei nem károsodnak, így funkciója megmaradhat.

A műtét várható időtartama 1 órán belüli. Fertőzés veszély esetén antibiotikum védelmet biztosítunk. Műtét után a beteg kórtermébe kerül vissza. A műtétet követő napon eltávolításra kerül a végbélbe helyezett gézcsík. Ezt követően naponkénti fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő ülőfürdőzés javasolt.

Normál székletürítés után történik a beteg hazabocsátása. A műtét során behelyezett varratok spontán felszívódnak, vagy a széklettel kiürülnek.

Szövődmények:

A műtét elhagyása esetén IV. stádiumban a fájdalom és vérzésveszély fokozódása mellett, életet veszélyeztető gyulladással folyamat is felléphet. A III. stádiumban fokozódó fájdalom és vérzésveszély léphet fel, a betegség előrehaladása előre nem kiszámítható.

Késői szövődményként végbélszűkület és széklet visszatartási nehezítettség alakulhat ki. A közvetlen műtét körüli fájdalom gyógyszeresen jól kezelhető. A műtét közvetlen szövődményei közül a műtéti területből eredő vérzés és végbélkörüli gyulladás emelhető ki.

Kijelentem, hogy a műtét jelentőségével és lehetséges szövődményével kapcsolatban a kellő felvilágosítást megkaptam, azt megértettem és tudomásul veszem, annak elvégzésébe beleegyezem.

Karcag,

.....
felvilágosítást végző orvos

.....
beteg, vagy törvényes képviselőjének aláírása

Az 1997. évi CLIV. törvény 15. § (4) bekezdése értelmében, amennyiben a beteg aláírásra nem képes, akkor szóbeli nyilatkozat, vagy ráutaló magatartás, vagy +++ aláírás esetén, előttünk, mint tanuk előtt:

Tanuk:

1.....

név

.....

levelezési cím

.....

aláírás

2.....

név

.....

levelezési cím

.....

aláírás

A beteg akaratnyilvánításra képtelen állapotban van és törvényes képviselője nincs jelen.

Karcag,.....

.....

felvilágosítást adó orvos aláírása, pecsétje

Ezennel a műtéthez a **beleegyezésemet megtagadom**, és vállalom annak minden egészségügyi, valamint jogi következményét.

Az elutasítás hátrányos következményeiről a felvilágosítást megkaptam, azt megértettem.

Karcag,.....

.....

beteg aláírása vagy törvényes képviselő aláírása

Az 1997. évi CLIV. törvény 20.§ alapján előttünk, mint tanuk előtt:

Tanuk:

1.....

név

.....

levelezési cím

.....

aláírás

2.....

név

.....

levelezési cím

.....

aláírás