



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

ALTATÁS, ÉRZÉSTELENÍTÉS

TÁJ/1341

Tisztelt Betegünk!

A fájdalmas vizsgálatokat, műtéteket érzéstelenítés alatt végezzük. Röviden ismertetjük az érzéstelenítés és altatás különböző módjait, melyek közül mindig azt javasoljuk, Önnek, ami a legjobban megfelel a tervezett műtét és az Ön általános állapota szempontjából.

Az altató orvos feladata, hogy a műtét során Ön ne érezzen fájdalmat és fenntartsa szervezete normális működését.

Altatás, (általános érzéstelenítés):

Az altatás kezdetén fokozatosan alváshoz hasonló állapotba kerül és a fájdalommentesség az egész testre kiterjed. Előkészítő gyógyszerek (többnyire injekció) után az altatást általában vénás injekcióval kezdjük. Hosszabb műtéteknél ezt ismételjük, vagy altató gázokat adunk arcmaszka, illetve a légsőbe vezetett tubus segítségével. Ez utóbbit akkor végezzük, amikor Ön már alszik. Ezzel a módszerrel közvetlenül a tüdejébe jutatjuk az oxigént és az altató gázokat. Ezt a módszert alkalmazva izomlazítókat is adhatunk, ami az operáló orvos és Ön számára egyaránt jobb műtéti feltételeket biztosít. Az altatás során a meglazult fogak sérülhetnek, rekedtség jelentkezhet, esetleg torokfájás fordulhat elő. Szakképzett személyzettel (altató orvos és asszisztensnő) és modern altatógépekkel, korszerű gyógyszerekkel a szövődmények ritkák. Elkerülésük érdekében a szervezet működését különféle készülékek segítségével (EKG, gázelemző) folyamatosan ellenőrizzük.

Nem kívánjuk titkolni Ön előtt, hogy rossz általános állapot, a műtéttől függetlenül is fennálló kísérő betegségek, illetve hosszú, nagy műtétek esetén a szövődmények lehetősége megnő.

Helyi érzéstelenítés:

A fájdalommentesség a test bizonyos körülírt területeire, az operáció helyére korlátozódik, altatással nem párosul. A helyi érzéstelenítés kisebb megterhelést jelent a szervezetre. A kar fő idegtörzsének érzéstelenítése a felső végtag fájdalomatlanságát okozza.

A gerincközeli (spinalis vagy epiduralis) érzéstelenítésnél az alsó végtag, csípő, és az alhas fájdalom mentessége érhető el. Ennél a módszernél a gerincoszlop egy megadott pontján érzéstelenítő oldatot fecskendezünk az érző idegek köré. Ezt követően néha múltó fejfájás jelentkezhet. Bénulástól nem kell tartania.

A műtét előtti időszak:

Műtétje előtt aneszteziológus orvosainak egyikével találkozni fog, hogy megismerjék egymást és megvizsgálja Önt. Ezek ismeretében azt az érzéstelenítési módot javasoljuk, ami a legcélravezetőbb.

Rendszeresen szedett gyógyszereit mutassa meg altató orvosának, aki el fogja mondani, hogy mely gyógyszereket hagyja ki és melyiket szedje. Forduljon hozzá bizalommal és bátran kérdezzen!

Dr. Tóth Beáta

Készítette:

Ellenőrizte:

21

Verzió: 02

Dátum: 2012. október 15.

1/2



BETEGTÁJÉKOZTATÓ
ALTATÁS, ÉRZÉSTELENÍTÉS

TÁJ/1341

Kérjük, ügyeljen a következőkre:

- Hat órával a műtét kezdete előtt ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon!
- Kivehető fogprotézisét, kontaktlencséjét távolítsa el.
- Vegye le ékszereit, mossa le a körömlakkot, szemfestéket.

Beleegyező nyilatkozat:

A tervezett műtétemhez szükséges érzéstelenítésbe, altatásba beleegyezem. az érzéstelenítéssel kapcsolatos felvilágosító tájékoztatót írásban megkaptam. Lehetőségem volt arra, hogy elolvassam, és az érzéstelenítést végző orvossal megbeszéljem. Kérdéseimre kielégítő választ kaptam.

Karcag, 20.....

.....

tájékoztatót adó orvos

.....

beteg

Tanúk:

1.
név

2.
név

Lakcím:
.....

Lakcím:
.....

.....
aláírás

.....
aláírás