



BETEGTÁJÉKOZTATÓ ENDOCARDITIS PROFILAXIS

TÁJ/1347/b

ENDOCARDITIS IGAZOLVÁNY

Név:
Szül.:
Lakcím:
Diagnózis:

Közgyógyell. Ig. sz.:

Gondozó: Dr. Hidvégi Erzsébet
5300. Karcag, Zöldfa u. 48.
Tel.: 59/507-111

Penicillin allergia:

Egyéb allergia:

Endocarditis profilaxis indokolt:

- Fogászati, szájsebészeti beavatkozások, (amelyek gingiva, ill. szájnyálkahártya vérzéssel járhatnak).
- Tonsillectomia és/ vagy adenotomia
- Bronchoscopya
- Cystoscopya
- Urethra katéterezés, húgyúti infectio
- Seb incisió, ill. drainálás, műtét.

Fogászati, szájsebészeti, felsőlégúti műtéti beavatkozások esetén ajánlott kezelés:

Amoxicillin 50 mg/kg per os 1 órával előtte

Ampicillin 50 mg/kg iv., vagy im. 30 perccel előtte 25 mg/kg 6 órával utána

- Penicillin allergia esetén:

Klindamycin 10 mg/kg per os 1 órával előtte, 5 mg/kg utána

Erythromycin 30 mg/kg per os 1 órával előtte, 30 mg/kg 4 részletben utána

Wilprafen 5 mg/kg per os előtte, 6 órával utána

Húgyúti, gyomor- bérendszeri, sebészeti beavatkozások esetén:

Ampicillin 50 mg/kg iv. 30 perccel előtte + 6 órával utána és

Gentamycin 2 mg/kg iv. 30 perccel előtte + 6 órával utána

Penicillin allergias esetén:

Vencomycin 20 mg/kg inf. 30 perccel előtte + 6 órával utána és

Gentamycin 2 mg/kg iv., 30 perccel előtte + 6 órával utána

Amoxicillin tartalmú készítmények:

Augmentin injekció

(600 mg/ ampulla)

Augmentin tabletta

(250mg/tabla.)

Augmentin szirup

(25 mg/ml)

Humamoxin kapszula

(250 mg, 500 mg/caps.)

Humamoxin szirup

(125 mg/5 ml, 250 mg/ 5 ml)



Készítette: *Kapriel János*

Jóváhagyta:

Verzió: 02

2011.11.02.

1/1