



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

EPEHÓLYAG LAPAROSCOPOS ELTÁVOLÍTÁSA

TÁJ/1316

Tisztelt Betegünk!

A műtéthez, amelyet tervezünk, szükséges a belecgyezése. Ahhoz, hogy dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről és a szóba jöhető szövődményekről.

A betegség

Az elvégzett vizsgálatok az Ön esetében epehólyag kövességet igazoltak. Ez az elváltozás Magyarországon népbetegségnek tekinthető, hiszen a lakosság 8- 10 %- át érinti.

A betegség veszélyei, kezelési lehetőségek

Epekő a rosszul működő, teljes kiürülésre képtelen epehólyagban keletkezik. Tünetmentes epekövesség éveken keresztül fennállhat, azonban ugyanazokat a veszélyeket hordozza magában, mint az epetünetes betegek esetében. Görcsöket, hasi puffadást, emésztési nehezítettséget, teltségérzést okozhat, súlyosabb esetben epehólyag elzáródást, epehólyag gyulladást, sárgaságot, következményes hashártyagyulladást. Az évtized/ek/ig meglévő epekövesség esetén az epehólyag daganatos elváltozása is reális veszély.

Kimutatott epekövesség esetén az epehólyag műtéti eltávolítása javasolt. A műtét elmaradása esetén az Ön fent leírt panaszai fokozódhatnak.

Alternatív lehetőségként jön szóba az ultrahangos epekőzúzás és epekőoldó gyógyszerek tartós szedése. Ezen módszerek mellett a beteg a műtétet elkerüli, de eredményességük bizonytalan és mivel a rosszul működő epehólyag a helyén marad, újabb kialakulásának az esélye nagy. Az ultrahangos epekőzúzás során kialakuló kisebb, éles kódarabok az epehólyag vezetékbe beszorulva szövődményeket okozhatnak. Az epekőoldó gyógyszerek csak a tisztán koleszterinből álló kövek oldására alkalmasak, melyek Európában az epekőeknek csak kisebb százalékát adják.

A műtét

A műtétet altatásban végezzük.

A technika fejlődése lehetővé tette, hogy az epehólyagot úgynevezett „laparoszkoapos” módszerrel távolítsuk el. Ez azt jelenti, hogy a hasüreget nem nyitjuk meg hasmetszés során, hanem egészen kis nyílásokon keresztül csöveket, műszereket vezetünk be és videó rendszer segítségével végezzük el a beavatkozást.

Ennek előnyei:

- kisebb műtéti megterhelés,
- rövidebb kórházi tartózkodás és gyógyulási időszak,
- a kevesebb fájdalom,
- a jobb kozmetikai eredmény.



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

EPEHÓLYAG LAPAROSCOPOS ELTÁVOLÍTÁSA

TÁJ/1316

Természetesen műtét közben kiderülhet, hogy mégis hasmetszésre kényszerülünk, azonban ennek esélye mindössze kb. 0,5 -6 %.

A műtét lényege az, hogy a köve/ke/t tartalmazó epehólyagot eltávolítjuk. Ez lényegesen nem fogja befolyásolni a beteg további sorsát, csupán a májban termelődő epe ezután folyamatosan jut a vékonybélbe az epecsatornán keresztül.

Lehetséges szövődmények

A kezelés eredményességéért, a rizkómentességért a tudomány mai állása szerint teljes felelősséget az orvos nem vállalhat. A kis metszés természetesen nem jelent kis műtétet is.

Műtét alatti szövődmény lehet vérzés, epecsatorna vagy más hasúri szervek falának sérülése. Ezek jelentős része azonban még műtét alatt észrevehető és korrigálható. Szükség lehet ilyenkor hasmetszés alkalmazására is.

A műtét utáni szakban előforduló szövődmények:

Vérzés, utóvérzés

A műtét során megfelelő módszerekkel a vérzéseket csillapítjuk, mégis néhány százalékban előfordulhat utóvérzés, melyet a drainen ürülő vér mennyiségéből, valamint egyéb jelekből lehet észlelni. Ebben az esetben szükség lehet a műtét terület újbóli feltárására és a vérzés műtét csillapítására. Egyes esetekben műtét nélkül is elérhető a vérzés megállása. Szükség lehet vér és / vagy vérkészítmény adására.

A műtét seb fertőződése, gennyedése

A műtét steril körülmények között zajlik, ennek ellenére előfordulhat a műtét seb befertőződése, elgennyedése. Ilyenkor szükség lehet a seb feltárására.

Epecsorgás

A műtét utáni epecsorgás oka lehet az epehólyag ágyhoz vezető apró járulékos epeútból történő epeszivárgás. Ez általában magától megszűnik.

Oka lehet továbbá a műtét során kapocccsal lezárt epeútból szivárgás, illetve oka lehet fel nem ismert epeúti sérülés. Ezen esetek egy részében endoszkópos úton történő epeútfestés során a sérülés helye megállapítható és áthidaló eszköz behelyezésével az epecsorgás megszüntethető. Amennyiben ezen beavatkozás nem sikeres, újabb műtetre (általában hasmetszéssel) lehet szükség.

Thromboemboliás szövődmények

Mint minden műtét beavatkozásánál, ezen műtétéknél is a nagyobb vénákban vérrög (trombózis) alakulhat ki, mely leszakadva egy másik ér ürterét elzárhatja (embólia). Megelőzésére véralvadásgátló anyagot – kis molekulásúlyú heparin injekciót a has bőre alá – adunk, mely vérzékenységhez, egyes esetekben súlyos véralvadási zavarokhoz vezethet.



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

EPEHÓLYAG LAPAROSCOPOS ELTÁVOLÍTÁSA

TÁJ/1316

Bélműködési zavarok

Mint minden hasi műtét után, a laparoszkoos epehólyag eltávolítás után is felléphet kisebb-nagyobb bélműködési zavar. A székletrendezéshez szükség szerint beöntéssel vagy hashajtással járulunk hozzá.

A laparoszkoos műtétek a hasüreg számára kis megterhelést jelentenek, így kisebb arányban alkulnak ki olyan bélösszenövések, melyek a későbbiekben bélműködési zavarokhoz, görcsökhöz, illetve akár bélelzáródáshoz is vezethetnek. Amennyiben hasmetszésből történik a műtét, az ilyen összenövések kialakulásának okozója lehet fennálló egyéb kísérőbetegség is (magasabb vérnyomás, különféle szívbetegségek, cukorbetegség, stb).

A műtét körüli időszak jellemzői

Az operáló orvos meghatározza, hogy az otthonában esetlegesen szedett véralvadásgátló gyógyszereket (pl. Syncumar, Aspirin) szüneteltesse, illetve helyette milyen más gyógyszert – leggyakrabban a bőr alá beadott kismolekulasúlyú heparint – állítsunk be. A műtét előtti napon délután a bélrendszer kiürülése hashajtó adásával történik, a műtét reggelén beöntést kap.

A beavatkozás után

- a műtétet követően infúzióban folyadéppótlást kap, fájdalmát csillapítjuk, pulzusát, vérnyomását rendszeresen ellenőrizzük. Esetleges egyéb kísérőbetegségei további gyógytornász segítségével megkezdjük a gyógytornát.
- a hasúri csövet, amennyiben kóros folyadék nem ürül rajta, a műtét utáni 24 – 48. órában távolítjuk el
- ha állapota engedi, a csökvétel napján már otthonába bocsátjuk
- a varratokat a seb gyógyulása után, a műtét utáni 7. napon távolítjuk el.
- tusolni a varratszedés után azonnal szabad, tartósabb vízben tartózkodás (fürdés, úszás) csak 2-3 hét múlva javasolt.
- Beszélje meg kezelőorvosával a szükséges további teendőket.

Gyógyulási kilátások

A laparoszkoos epehólyag eltávolítás gyógyulási eredménye világszerte nagyon jó, kicsi a műtéti kockázat, nem változtatja meg az operált aktivitását, munkaképességét. Célunk az, hogy ne szoruljon élete végéig diétára.

Műtét után a kórházban tartózkodási idő általában 3-5 nap, a műtét előtti aktivitás visszatérése általában 2-3 hét múlva várható. Mindezeket természetesen kísérőbetegség/ek/ megléte, az esetleges szövődmények, a beteg állapota és munkaköre befolyásolhatják.

Kijelentem, hogy a műtét jelentőségével és lehetséges szövődményével kapcsolatban a kellő felvilágosítást megkaptam, azt megértettem és tudomásul veszem, annak elvégzésébe beleegyezem.



BETEGTÁJÉKOZTATÓ
EPEHÓLYAG LAPAROSCOPOS ELTÁVOLÍTÁSA

TÁJ/1316

Karcag, 20.....

.....
a felvilágosítást végző orvos aláírása

.....
a beteg, vagy törvényes képviselőjének aláírása

Tanuk:

1.
név

2.
név

Lakcím:

Lakcím:

.....

.....

.....
aláírás

.....
aláírás