



BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐ NŐK SZÁMÁRA

TÁJ/1325

Tisztelt Betegünk!

Ön bizonyára felkészült a szülésre és tájékozódott a szülés lefolyásáról. Szeretnénk tájékoztatni arról, hogy a szülés során milyen beavatkozásokra kerülhet sor. Ezek a beavatkozások az Ön és gyermeke egészségének megőrzése érdekében történnek és a szülés biztonságát szolgálják.

Elvégzésükhöz az Ön beleegyezésére is szükség van.

A szülőszobára történő felvétele után a következő vizsgálatokat végezzük el: ellenőrizzük a magzat szív működését, a méhszáj tágasságának megállapítása hüvelyen vagy végbélen át történik. Ha a magzatburok nem repedt meg, a magzatvíz mennyiségét és színét a méhszájon keresztül felvezetett csövön át egy optikai eszköz segítségével ítéljük meg (aminoszkópia). A terhesgondozóból jól ismert módon ellenőrizzük a vérnyomást, megvizsgáljuk a vizeletet. Ezt követi a szüléshez történő előkészítés (a szeméremszőrzet leborotválása a gáton, beöntés a méhszáj tágasságától függően, zuhanyozás).

A vajúdas során gyakran ellenőrizzük a magzati szív működést és a méhösszehúzódásokat a hasfalra rögzített műszer segítségével. A méhszáj tágulását.

A szülés haladását hüvelyi vagy végbélen át végzett vizsgálat segítségével állapítjuk meg. A szülési fájdalom csökkentésére szülőszobánkon jelenleg kábító- fájdalomcsillapító gázkeverék áll rendelkezésre – ha ezt Ön kívánja. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a szülésznők részletesen elmagyarázzák. A szülési fájdalmat csökkenti és a tágulást meggyorsítja a meleg vízben zuhanyzás. Ha élni szeretne ezzel a lehetőséggel, kérje a szülésznő segítségét.

A magzat megszületésekor gyakran végzünk gátmetszést. A gátseb és az esetlegesen keletkezett hüvelyfali sérülés ellátása helyi érzéstelenítésben történik. Ritkán előfordul, hogy a méhlepény vagy a magzatburok nem távozik egészben. Ilyenkor kézzel vagy műszerrel betapintunk a méh üregébe és a visszamaradt részeket eltávolítjuk. A műtéti heg ellenőrzése céljából hasonlóan járunk el akkor is, ha valaki előző szülése császármetszéssel végződött.

A legtöbb szülés zavartalanul lezajlik. Az esetek egy részében azonban műtéti megoldás válik szükségessé. Ezeket a műtéteket megfelelő felkészültséggel biztonságosan el tudjuk végezni a nap bármely szakában, így szövődmény csak nagyon ritkán fordul elő (vérzés, a nemi szervek vagy a környező szövetek, szervek sérülése, a magzat sérülése, esetleges meddővétel).

A császármetszést gerincközeli, gerincvelői érzéstelenítésben vagy altatásban végezzük. Erről szükség esetén az érzéstelenítést végző orvos ad részletes felvilágosítást.

Ha sürgős beavatkozásra a szülés kitolási szakában van szükség, akkor a magzat gyors megszületését a magzat fejére helyezett szívóharanggal segítjük. A kíméletesen végrehajtott ún. „vákumos szülés” nem okoz sérülést.

Szükség esetén a szülés folyamán segítségül hívunk más szakorvost is. Bármilyen felmerülő kérdésre a szülőszoba személyzete ad további felvilágosítást.



BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐ NŐK SZÁMÁRA

TÁJ/1325

A fenti tájékoztatást tudomásul vettem, azt megértettem, kérdéseimre választ kaptam.

A szükségessé váló vizsgálatok, beavatkozások elvégzéséhez hozzájárulok, kérem a szükségessé váló műtét elvégzését.

Karcag, 20.....

.....

a felvilágosítást végző orvos aláírása

.....

a beteg, vagy törvényes képviselőjének aláírása

Tanúk:

1.

név

2.

név

Lakcím:

.....

.....

aláírás

Lakcím:

.....

.....

aláírás