



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

HASNYÁLMIRIGY DAGANAT ESETÉN VÉGZETT MŰTÉTRŐL

TÁJ/1328

Tisztelt Betegünk!

A műtéthez, melyet tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségről, valamint a beavatkozás jelentőségéről, módjáról, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

A betegség

Önnél az eddigi vizsgálatok a hasnyálmirigy rosszindulatú daganatát állapították meg.

A betegség következményei és a kezelés lehetőségei:

A rosszindulatú hasnyálmirigy daganat legtöbbször nagymértékű fogyást, hátba sugárzó fájdalmat okoz, az esetek egy részében epeúti elzáródás következtében sárgaság léphet fel.

Gyakran megelőző heveny és krónikus hasnyálmirigy- gyulladás szerepel a kórtörténetben.

A daganatnak a környező szervek felé terjedése, illetve távoli áttétképződésre nagyfokú hajlama van. A hasnyálmirigy daganat kezelése egyértelműen sebészi, csak a daganatos szerv részleges vagy teljes eltávolítása adhat gyógyulást.

Sebészileg nem eltávolítható és epeút- elzáródást okozó esetekben endoszkópos módszerrel epeúthidálásra (stentbeültetés), illetve műtéti úton epeút- bél összeköttetésre lehet szükség.

Műtéti eljárások:

A műtétet altatásban végezzük, részleteiről az altatóorvostól kap felvilágosítást.

A műtéti behatolás általában a has felső felében ejtett ívelt haránt- metszés.

A hasnyálmirigy bal felében lévő daganatoknál a hasnyálmirigy farokrészének eltávolítása, a fejben és a jobb félben lévő tumoroknál a hasnyálmirigy jobb felének eltávolítása szükséges. Minden esetben a környező nyirokcsomók is eltávolításra kerülnek. A jobb oldali műtéteknél a hasnyálmirigy fejjel együtt az attól el nem választható patkóbél is eltávolításra kerül. A megmaradt hasnyálmirigy, a gyomor, a fő epevezeték és a vékonybél között megfelelő összeköttetéseket készítünk varratok segítségével. Általában az epehólyagot is eltávolítjuk, egyes esetekben a lép is eltávolításra kerül.

A műtét kapcsán egy- vagy több hasúri cső kerül bevezetésre. Orrán keresztül szondát vezetünk a gyomrába, hólyagkatéter kerül a húgyhólyagba. A vékonybélbe átmeneti táplálást biztosító vékony szondát vezetünk.

Műtétet követően az intenzív osztályra kerül a beteg.

Lehetséges szövődmények és következményes beavatkozások:

Vérzés, utóvérzés:

A műtét során megfelelő módszerekkel a vérzéseket csillapítjuk, mégis néhány százalékban előfordulhat utóvérzés, melyet a csövön (drainen) ürülő vér mennyiségéből, a seb megtekintéséből és megtapintásából, valamint egyéb jelekből lehet észlelni. Ebben az esetben szükség lehet a



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

HASNYÁLMIRIGY DAGANAT ESETÉN VÉGZEZTT MŰTÉTRŐL TÁJ/1328

műtési terület újbóli feltárására és a vérzés műtési csillapítására. Egyes esetekben műtét nélkül is elérhető a vérzés megállása. Szükség lehet vér és / vagy vérkészítmény adására.

A műtési seb fertőződése, gennyedése:

A műtét steril körülmények között zajlik, de ennek ellenére előfordulhat a műtési seb befertőződése, elgennyedése. Ilyenkor szükség lehet a seb feltárására.

Varratelégtelenség:

A bél-, hasnyálmirigy-, gyomor-, illetve epeúti varratok elégtelensége különböző okok miatt jöhet létre, ennek következménye a gyomor- béltartalom, epe-, illetve hasnyálmirigy váladék hasüregbe jutása, következményes hashártyagyulladással, illetve tályogképződéssel. A felderített varratelégtelenség miatt a legtöbbször újabb műtési beavatkozásra lehet szükség. A kialakuló tályog esetleg ultrahang vagy CT vezérelve leszívható, és becsővezhető.

Tromboembóliás szövődmények:

Mint minden hasi műtési beavatkozásnál, ezen műtéteknél is a nagyobb vénákban vérrög (thrombosis) alakulhat ki, mely leszakadva egy másik ér ürterét elzárhatja (embolia). Megelőzésére véralvadásgátló anyagot – kis mennyiségű heparin injekciót a has bőre alá adunk, mely kétségtelenül vérzékenységhez, egyes esetekben súlyos véralvadási zavarhoz vezethet.

Bélműködési zavarok:

Mint minden hasi műtét után, a hasnyálmirigy daganat miatt végzett műtétek után is felléphet kisebb- nagyobb bélműködési zavar. A székletrendezéshez szükség szerint beöntéssel vagy hashajtással, bélmozgató gyógyszerek adásával járulunk hozzá, melyek akár műtétet igénylő bélelzáródáshoz vezethetnek.

Kérjük, mindenképpen figyeljen rá!

Hacsak az orvos másképpen nem rendeli el...

A beavatkozás előtt:

Az operáló orvos meghatározza, hogy a véralvadásgátló gyógyszereket (pl. Syncumar, Aspirin) szüneteltesse, illetve helyette milyen más gyógyszer- leggyakrabban a bőr alá beadott kismolekulasúlyú heparint – állítsunk be.

A beavatkozás után:

- a műtétet követően, infúzióban folyadékpótlást kap, fájdalmát csillapítjuk, pulzusát, vérnyomását rendszeresen ellenőrizzük, illetve esetleges egyéb kísérőbetegségei további ellenőrzéseket tehetnek szükségessé
- a műtét után állapotától függően gyógytornász segítségével megkezdjük a gyógytornát
- a varratokat a műtét utáni 10. napon távolítjuk el



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

HASNYÁLMIRIGY DAGANAT ESETÉN VÉGZETT MŰTÉTRŐL

TÁJ/1328

- tusolni a varrat, illetve kapocsszedés után azonnal szabad, tartósabb vízben tartózkodás (fürdés, úszás) csak 2-3 hét múlva javasolt.
- fizikai megterhelés a műtétet követő 4 hétben nem javasolt
- beszélje meg kezelőorvosával a szükséges további teendőket.

Életmódbeli változások:

Amennyiben a daganatot időben fedeztük fel és teljes egészében sikerült eltávolítani, az Ön hosszú távú gyógyulási kilátásai jók, azonban rendszeres ellenőrzésre szorul a műtét utáni első öt évben. Szövetteni és műtéti leleteinek birtokában az Onkológiai Bizottság további kezelésre tehet javaslatot.

Az inzulintermelés kiesése esetén cukorbetegség alakulhat ki, mely diabetológiai gondozást igényelhet. A műtétet követően megfelelő diéta betartása, enzimpótlás, szigorú alkoholtilalom szükséges.

Kijelentem, hogy a beavatkozással, annak jelentőségével és lehetséges szövődményeivel kapcsolatban a kellő felvilágosítást megkaptam, azt megértettem és tudomásul veszem. A beavatkozás elvégzésébe önként beleegyezem.

Karcag, 20.....

.....
a felvilágosítást végző orvos aláírása

.....
a beteg, vagy törvényes képviselőjének aláírása

Tanúk:

1.
név

2.
név

Lakcím:

Lakcím:

.....

.....

.....

aláírás

.....

aláírás

