



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Infectiv endocarditis (IE) profilaxisa

TÁJ/1347/a

Infectiv endocarditis (IE) profilaxisa

(módszertani levél)

Profilaxis szükséges:

- műbillentyűs betegek
- IE a kórelőzményben
- nem operált cyanoticus veleszületett szívbetegség, beleértve a palliatív shuntok és conduitok
- rekonstruált congenitális szívbetegség, ha műanyag behelyezésével járt, 6 hónapig
- rekonstruált congenitális szívbetegség, residualis defectussal

Profilaxis szükséges:

- foghúzás
- periodontális beavatkozás, beleértve a depurálást
- gyökércsatorna beavatkozások

Nem szükséges profilaxis a léguti, gastrointestinalis és urogenitális műszeres vizsgálatok alkalmával valamint bőr és lágyrész beavatkozásoknál, ha azok nem fertőzött elváltozás miatt történnek.

A beavatkozások profilaktikus antibiotikus sémája:

Séma típus	Gyógyszer	Dózis
Alap	Amoxicillin	felőtt 2 gr per os gyermek: 50 mg/tskg 1 órával a beavatkozás előtt
Orális bevitel nem lehetséges	Ampicillin	felőtt: 2 gr iv. gyermek: 50 mg/tskg iv. 30 perccel a beavatkozás előtt
Penicillin allergia	Clindamycin	felőtt: 600 mg per os, vagy iv. gyermek: 20 mg/tskg per os vagy iv. 1 órával a beavatkozás előtt.

Irodalom: 1. European Heart Journal: Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endocarditis (new version 2009) 2. A Kardiológiai Szakmai Kollégium ajánlása 2010: Infectiv endocarditis