



BETEGTÁJÉKOZTATÓ
VALAMELY VÉGTAG SEBÉSZI
ALTÁVOLÍTÁSÁRÓL (AMPUTÁCIÓ)

TÁJ/1357

Osztály neve:
Osztályvezető:

OEP KÓD:
Tel.:

Betegájékoztató és beleegyező nyilatkozat

Beteg neve:
Lakcíme: ,
Anyja neve:

Születési ideje:
TAJ száma:
Törzsszáma:

Tisztelt Betegünk!

A műtéthez, melyet tervezünk, szükséges az Ön beleegyezése. Ahhoz, hogy dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségről, valamint a beavatkozás jelentőségéről, módjáról, következményeiről és a szóba jöhető szövődményekről.

A betegség

Panaszai és az elvégzett vizsgálatok verőér szűkület, elmeszesedés, elzáródás miatt kialakult üszkösödést (gangrénát) igazoltak. Ez az ön esetében sem konzervatív eljárásokkal, sem antibiotikum adással, sem érsebészeti műtéttel, érplással nem befolyásolható.

A betegség és veszélyei

Az üszkösödés az a jelenség, amikor az elhalt területen másodlagosan jellegzetes elváltozások alakulnak ki. Lehet száraz, amikor az elhalt szövetek arra kedvező körülmények, nedvesvesztés következtében beszáradnak, zsugorodnak, keménnyé és a széteső vörösvérsejtektől sötétbarnává válnak (mumifikáció). Nedves üszkösödés esetén az elhalt területeken rothasztó baktériumok telepednek meg, a szövetek ellágyulnak és mállékony, pépszerű, szürkésfekete, zöldesszürke és a termelőző gázoktól bűzös anyaggá alakulnak át.

Elhanyagolt vagy gyógyulási hajlamot nem mutató esetekben az üszkösödés és a gyulladás fokozatosan terjed a lábujjaktól a comb irányába. Ez előrehaladott állapot esetén életet veszélyeztető általános vérmérgezést okoz. Csupán antibiotikum kezeléssel, konzervatív eljárásokkal, értágító gyógyszerek adásával, sebkötözéssel, feltárással nem lehet az ilyen eseteket megoldani. Érsebészeti beavatkozásra, érplásra, súlyos, előrehaladott állapotban már nincsen lehetőség.

Műtéti eljárások

Az üszkös végtagot (.....) általános érzéstelenítésben, vagy gerincvelői érzéstelenítésbenszintben távolítjuk el, amputáljuk. Szükség esetén a váladék elvezetése céljából csövet helyezünk a sebvonalba.



BETEGTÁJÉKOZTATÓ
VALAMELY VÉGTAG SEBÉSZI ALTÁVOLÍTÁSÁRÓL
(AMPUTÁCIÓ)

TÁJ/1357

A beavatkozás körüli időszak jellemzői:

A beavatkozás után:

- A műtétet követően infúzióban folyadékpótlást kap, fájdalmát csillapítjuk, pulzusát, vérnyomását rendszeresen ellenőrizzük, illetve esetleges egyéb kísérőbetegségei további ellenőrzéseket tehetnek szükségessé.
 - A műtétet követő 24 órán belül lábujj amputáció után segítséggel felkelhet. Lábszár vagy comb szintű amputáció esetén gyógytornász bevonásával mobilizációját megkezdjük.
 - A műtét utáni első napon folyadékot, majd normál étrendet fogyaszthat.
- A sebet kezdetben napi rendszerességgel kötni kell.

A műtét után a kórházi tartózkodás ideje általában 10-14 nap.

Lábszár szintű vagy comb szintű amputáció esetén:

A varratokat általában a 14. napon távolítjuk el.

Rehabilitáció, lehetőség esetén művégtaggal való ellátás ezt követően, erre szakosodott intézetekben történik előzetes megbeszélést követően.

Beszélje meg kezelőorvosával a szükséges további teendőket.

Kijelentem, hogy a műtét jelentőségével és lehetséges szövődményével kapcsolatban a kellő felvilágosítást megkaptam, azt megértettem és tudomásul veszem, annak elvégzésébe beleegyezem.

Karcag, 20

.....
felvilágosítást végző orvos

.....
beteg, vagy törvényes képviselőjének aláírása

Tanuk:

1. 2.
név név

Lakcím: Lakcím:

.....

.....
aláírás aláírás